

使用上の注意

下記を必ず読み、口に✓を入れてください。

- バイアグラ・レビトラ・シアリス錠は、他の人に譲り渡さないでください。
 - バイアグラ・レビトラ・シアリス錠を処方量より多く服用しないでください。
 - バイアグラ・レビトラ・シアリス錠服用後、24時間以内に他のバイアグラ・レビトラ・シアリス錠を服用しないでください。
 - バイアグラ錠は性行為の約1時間前に服用してください。尚、バイアグラ錠は空腹時に服用した方が効果的です。
 - レビトラ・シアリス錠は、性行為の約1時間前に服用してください。どちらの薬も食事の影響は受けにくいので、空腹時でなくとも構いません。
 - バイアグラ・レビトラ・シアリス錠の服用後は高い所での作業、自動車や機械の運転操作には注意してください。
 - 副作用として、顔のほてり、頭痛、鼻づまり、消化不良、はきけ、動悸、物が青く見えたり、まぶしく見える、等があります。また、これ以外にも副作用が出ることもありますので、服用後に何か異常を感じたら直ちに医師に相談してください。
 - バイアグラ・レビトラ・シアリス錠は、精力増強剤ではありません。興味本位で本剤を服用しないでください。本剤なしに勃起できなくなることもあります。
 - バイアグラ・レビトラ・シアリス錠は性感染症を防ぐものではありません。
 - バイアグラ・レビトラ・シアリス錠服用後に4時間以上勃起が続く場合は、直ぐに医師の診察を受けてください。陰茎損傷の危険があります。
 - 他院で処方されている薬、注射薬はすべて医師に知らせてください。
 - 定期的に内服している薬剤がある場合は、処方先の医師にバイアグラ・レビトラ・シアリス錠を服用していることを知らせてください。
 - 新しい薬の処方または注射を受ける場合は、処方先の医師にバイアグラ・レビトラ・シアリス錠を服用していることを知らせてください。
 - 糖尿病、高血圧、心疾患がある場合、バイアグラ・レビトラ・シアリス錠を服用するのは危険です。
 - 降圧剤、亜硝酸剤、血小板凝集抑制剤とバイアグラ・レビトラ・シアリス錠の併用は危険です。
 - 勃起に関与する血管や神経に大きな障害がある場合や、ストレス等で大脳の性中枢に興奮が起きない場合には効果は期待できません。
 - 危険防止のため、バイアグラ・レビトラ・シアリス錠を服用していることを、パートナーまたは家族に知らせてください。
 - 救急の場合にも、バイアグラ・レビトラ・シアリス錠を服用していることを、必ず関係者に知らせてください。
 - 医師の指示に従って定期的に健康診断を受け、心臓や血圧に異常がないことを確認してください。
 - 使用上の注意をよく守って、バイアグラ・レビトラ・シアリス錠をご使用ください。
-

承諾書

私が貴院において処方を受けるにあたり、担当医師からその内容について説明を受け、十分に理解しました。私は上記の項目を遵守します。

年 月 日

氏名 _____